

The Japanese Journal of PHYCOLOGY

CONTENTS

Taizo Motomura: Disappearance of centrioles derived from female gametes in zygotes of <i>Colpomenia bulbosa</i> (Phaeophyceae)	207
Keitaro Kiyosawa: Toxicities of pH buffer solutions to <i>Chara</i> internodal cells	215
Adam T. Wilczok, Makoto M. Watanabe, Sanae Kawahara, Kazuo T. Suzuki and Kioshi Sugahara: Intracellular cadmium sequestration by the heavy metal-tolerant green algae <i>Chlorella vulgaris</i> and <i>Uronema confervicolum</i>	229
Christine A. Orosco and Masao Ohno: Growth rates of <i>Gracilaria</i> species (Gracilariales, Rhodophyta) from Tosa Bay, southern Japan	239
Shigeru Kumano, Masao Nishiumi, Goh Okuzumi and Hiroshi Sato: Diatom assemblages at the estuary of Fukuda River in Kobe along the northwestern coast of Osaka Bay with special reference to the Holocene sedimentary history	245
Takuji Uchida and Satoshi Arima: Regeneration of protoplasts isolated from the sporophyte of <i>Cladophora okamurae</i> Tokida (Chordariaceae, Phaeophyta)	261
Hisayoshi Nozaki and Shuji Ohtani: <i>Gonium sociale</i> (Volvocales, Chlorophyta) from Antarctica	267
Masahiro Notoya, Norio Kikuchi, Yusho Aruga and Akio Miura: <i>Porphyra kinositae</i> (Yamada et Tanaka) Fukuhara (Bangiales, Rhodophyta) in culture	(in Japanese) 273
<hr/>	
Notes	
Donald Kaczmarczyk and Robert G. Sheath: Pigment content and carbon to nitrogen ratios of freshwater red algae growing at different light levels	279
Mitsuo Kajimura: Lectotypification of <i>Scinaia moniliformis</i> J. Agardh (Galaxauraceae, Rhodophyta)	283
Sueo Kato: Discrimination of two types of pyrenoid centres by staining with propionocarmine	(in Japanese) 287
<hr/>	
Review	
Shunzo Suto: A trial to relate marine benthic floras more precisely to their environmental conditions	(in Japanese) 289
<hr/>	
Miscellanea	
Yusho Aruga: Habitat and distribution of "Facai", <i>Nostoc flagelliforme</i> (Cyanophyta)	(in Japanese) 307
Nobuyasu Katayama: "Algae" in science education at primary and lower secondary school level. (1) A survey of science textbooks for the last 40 years.	(in Japanese) 311
Shoji Kawashima: Picture painted by dried specimens of seaweed	(in Japanese) 317
Book Reviews	(in Japanese) 319
Announcement	(in Japanese) 321
Japanese Science Council News	(in Japanese) 322

日本藻類学会

日本藻類学会は1952年に設立され、藻学に関心をもち、本会の趣旨に賛同する個人及び団体の会員からなる。本会は定期刊行物「藻類」を年4回刊行し、会員に無料で頒布する。普通会員は本年度の年会費7,000円（学生は5,000円）を前納するものとする。団体会員の会費は12,000円、贊助会員の会費は1口20,000円とする。

庶務および会計に関する通信は、602 京都市上京区下立売通小川東入 日本藻類学会宛に、また「藻類」への原稿の送付は 184 小金井市貫井北町4-1-1 東京学芸大学生物学教室内 日本藻類学会編集委員会宛にされたい。

The Japanese Society of Phycology

The Japanese Society of Phycology, founded in 1952, is open to all who are interested in any aspect of phycology. Either individuals or organizations may become members of the Society. The Japanese Journal of Phycology (SÔRUI) is published quarterly and distributed to members free of charge.

Inquiries and other information regarding the society should be addressed to The Japanese Society of Phycology, Shimotachiuri Ogawa Higashi, Kamikyoku, Kyoto, 602 Japan. The annual dues (1990) for overseas members are 7,000 Yen (Send the remittance to The Japanese Society of Phycology at the above address).

Manuscript for publication should be submitted directly to the Editor-in-Chief, Prof. I. Shihira-Ishikawa, Department of Biology, Tokyo Gakugei University, Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo, 184 Japan.

1991-1992年役員

会長：有賀 祐勝（東京水産大学）

庶務幹事：庵谷 晃（東京水産大学）

会計幹事：能登谷正浩（東京水産大学）

評議員：

榎本 幸人（神戸大学）
福島 博
井上 煉（筑波大学）
石川依久子（東京学芸大学）
岩崎 英雄（三重大学）
香村 真徳（琉球大学）
喜田和四郎（三重大学）
増田 道夫（北海道大学）
右田 清治
中原 紘之（京都大学）
大野 正夫（高知大学）
小河 久朗（北里大学）
館脇 正和（北海道大学）
月館 潤一（南西海区水産研究所）
渡辺 信（国立環境研究所）
山岸 高旺（日本大学）

編集委員会：

委員長：石川依久子（東京学芸大学）

幹事：真山 茂樹（東京学芸大学）

実行委員：原 慶明（筑波大学）

岡崎 恵視（東京学芸大学）

渡辺 信（国立環境研究所）

委員：千原 光雄（日本赤十字看護大学）
堀 輝三（筑波大学）
加藤 哲也（京都大学）
小林 弘（東京珪藻研究所）
三浦 昭雄（青森大学）
大野 正夫（高知大学）
大森 正之（東京大学）
館脇 正和（北海道大学）
横浜 康継（筑波大学）
吉田 忠生（北海道大学）

Officers for 1991-1992

President: Yusho ARUGA (Tokyo University of Fisheries)

Secretary: Teru IORIYA (Tokyo University of Fisheries)


Treasurer: Masahiro NOTOYA (Tokyo University of Fisheries)

Members of Executive Council:

Sachito ENOMOTO (Kobe University)
Hiroshi FUKUSHIMA
Isao INOUE (University of Tsukuba)
Ikuko SHIHIRA-ISHIKAWA (Tokyo Gakugei University)
Hideo IWASAKI (Mie University)
Shintoku KAMURA (University of the Ryukyus)
Washiro KIDA (Mie University)
Michio MASUDA (Hokkaido University)
Seiji MIGITA
Hiroyuki NAKAHARA (Kyoto University)
Masao OHNO (Kochi University)
Hisao OGAWA (Kitazato University)
Masakazu TATEWAKI (Hokkaido University)
Jun-ichi TSUKIDATE (Nansei National Fisheries Research Institute)
Makoto M. WATANABE (National Institute for Environmental Studies)
Takaaki YAMAGISHI (Nippon University)

Editorial Board:

Ikuko SHIHIRA-ISHIKAWA (Tokyo Gakugei University), Editor-in-Chief
Shigeki MAYAMA (Tokyo Gakugei University), Secretary
Yoshiaki HARA (University of Tsukuba), Associate Editor
Megumi OKAZAKI (Tokyo Gakugei University), Associate Editor
Makoto M. WATANABE (National Institute for Environmental Studies), Associate Editor
Mitsuo CHIHARA (The Japanese Red Cross College of Nursing)
Terumitsu HORI (University of Tsukuba)
Tetsuya KATO (Kyoto University)
Hiromu KOBAYASI (Tokyo Diatom Institute)
Akio MIURA (Aomori University)
Masao OHNO (Kochi University)
Masayuki OHMORI (University of Tokyo)
Masakazu TATEWAKI (Hokkaido University)
Yasutsugu YOKOHAMA (University of Tsukuba)
Tadao YOSHIDA (Hokkaido University)



加藤季夫：プロピオニカーミン染色によるピレノイド・センターの 2 つの型の識別

Sueo Kato: Discrimination of two types of pyrenoid centres by staining with propionocarmine.

Key Index Words: *Euglena viridis—Eutreptiella eupharyngea—propionocarmine—pyrenoid centre—staining.*


Sueo Kato, Laboratory of Natural Science, Kokugakuin University, Higashi 4-10-28, Shibuya-ku, Tokyo, 150 Japan

ミドリムシ類の葉緑体の 5 種類の型の 1 つに、ピレノイド・センター (pyrenoid centre) あるいはバラミロン・センター (paramylon centre) から多くのリボン状の葉緑体片が放射状に拡がる型がある (Leedale 1967)。この型の葉緑体の微細構造は電子顕微鏡を用いて *Euglena viridis* Ehr. で調べられ (Leedale 1982), そのピレノイド・センターは 1 つのピレノイドからできていると報告されている。ところが, Walne *et al.* (1986) は *Eutreptiella eupharyngea* Walne *et al.* の葉緑体を電子顕微鏡で観察し, そのピレノイド・センターは *Euglena viridis* のものとは異なり, 多くのリボン状の葉緑体片の先端にあるピレノイドが集まって出来ていると報告している。このことから, ピレノイド・センターには 2 つの型があることが明らかになった。ピレノイド・センターがどちらのつくりをしているかは電子顕微鏡による観察でしか識別できないと考えられてきたが, 今回, ピレノイドの染色に用いられるプロピオニカーミン (Rosowski and Hoshaw 1970) でピレノイド・センターを染色することにより, 光学顕微鏡による観察でも両者を容易に識別できることが判明したので, ここで報告する。

材料と方法 : 実験には *Euglena viridis* のクローン培養株 E-1164 (神奈川県横浜市緑区の早淵川, 1991 年 2 月 28 日採集) と *Eutreptiella eupharyngea* のクローン培養株 ME-64 (神奈川県横須賀市佐島港, 1991 年 4 月 24 日採集) の 2 株を用いた。培養は温度 20°C, 照度 3000 lux, 12 時間明期・12 時間暗期の明暗周期の条件下で行い, E-1164 株には AF-6 培地 (加藤 1982) を, ME-64 株には PES 培地 (Provasoli 1966) をそれぞれ用いた。ピレノイド・センターの染色は対数増殖期の藻体を用い, プロピオニカーミン (固定時間 10 分, 1/10 浸度の媒染液で媒染時間 10 分, 染色時間 5 分) で行った。

結果と考察 : 光学顕微鏡での観察では, *Euglena viridis* の葉緑体はバラミロン粒で囲まれたピレノイド・センター (Fig. 1) とそれから放射状に拡がる多くのリボン状の葉緑体片からできており, ピレノイド・センターはプロピオニカーミンで染色すると 1 つの暗紫色の塊となっていた (Fig. 2)。一方, *Eutreptiella eupharyngea* の葉緑体もバラミロン粒で囲まれたピレノイド・センターとそれから放射状に拡がる多くのリボン状の葉緑体片からできており, *Euglena viridis* の葉緑体と同様のつくりをしているようにみえるが, そのピレノイド・センターはプロピオニカーミンで染色すると多くの小さい暗紫色の粒に分れていた (Fig. 4)。 *Eutreptiella eupharyngea* をノマルスキード式微分干渉装置を用いて観察すると, ピレノイド・センターは確かに分れているようにみえる (Fig. 3)。しかし, このような像は *Euglena viridis* においてもみられることがあることから, 染色なしにはピレノイド・センターがどちらの型かは判断が困難である。

今回のピレノイド・センターの染色による観察結果は, 電子顕微鏡での *Euglena viridis* (Leedale 1982) と *Eutreptiella eupharyngea* (Walne *et al.* 1986) の観察結果と一致しており, ピレノイド・センターが 1 つのピレノイドからできているか, それとも, 多くのピレノイドが集まってできているかは, プロピオニカーミンでピレノイド・センターを染色することにより光学顕微鏡でも容易に判断できることがわかった。ミドリムシ類のうち, *Eutreptia* 属, *Eutreptiella* 属および *Euglena* 属の *Radiatae* 亜属のものはピレノイド・センターから多数のリボン状の葉緑体片が放射状に拡がる葉緑体をもっているが, そのピレノイド・センターがどちらの型かについて明確になっているのは *Euglena viridis* と *Eutreptiella eupharyngea* の他には *Eutreptia pertyi* Pringsheim (Dawson and Walne 1991) に限られていると思われる。



Figs. 1-2. *Euglena viridis*. 1. A cell not stained. 2. A cell stained with propionocarmine. A pyrenoid centre is composed of one pyrenoid.

Figs. 3-4. *Eutreptiella eupharyngea*. 3. A cell not stained. 4. A cell stained with propionocarmine. Two pyrenoid centres are composed of many small pyrenoids. p: pyrenoid centre. Scale bars: 10 μm .

上記の3種のミドリムシ類以外のものについても、そのビレノイド・センターがどちらかのつくりをしているかについて今後調べる必要があり、それに関して、このプロピオニンカーミンによる染色法は処理が簡単で確実に識別できることから、有効な手段の1つと考えられる。

文 献

- Dawson, N. S. and Walne, P. L. 1991. Structural characterization of *Eutreptia pertyi* (Euglenophyta). I. General description. *Phycologia* 30: 287-302.
加藤季夫 1982. *Colacium vesiculosum* Ehr. の培養と形態. 藻類 30: 63-67.
Leedale, G. F. 1967. Euglenoid Flagellates. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Leedale, G. F. 1982. Ultrastructure, p. 1-27. In D. E. Bueutow [ed.], *The biology of Euglena*, vol. 3. Academic Press, London and New York.

Provostoli, L. 1966. Media and prospects for the cultivation of marine algae, p. 63-75. In Watanabe, A. and Hattori A. [ed.], *Culture and Collections of Algae*. Proc. U.S.-Japan Conf. Hakone, Sept. 1966. Jap. Soc. Plant Physiol.

Rosowski, J. R. and Hoshaw, R. W. 1970. Staining algal pyrenoids with carmine after fixation in an acidified hypochlorite solution. *Stain Tech.* 45: 293-298.

Walne, P. L., Moestrup, Ø, Norris, R. E. and Ettl, H. 1986. Light and electron-microscopical studies of *Eutreptiella eupharyngea* sp. nov. (Euglenophyceae) from Danish and American waters. *Phycologia* 25: 109-126.

総 説

海藻・海草相とその環境条件との関連をより詰めて求める試み

須 藤 俊 造

(186 東京都国立市谷保2686-12)

Suto, S. 1992. A trial to relate marine benthic floras more precisely to their environmental conditions. Jpn. J. Phycol. 40: 289–305.

The author tried to relate marine benthic floras in coastal waters more precisely to their environmental conditions from data in available reports.

In the present study, the 92 species of marine floras were chosen from those which occur commonly in their native waters and are easy to identify, so that more than 20 of them would be found in any open coastal waters. Their distributions in open coastal waters, in the Seto Inland Sea and in four other inland seas fully investigated are shown in 2 Tables. Floras are characterized respectively by the combination of the presence or absence of each of the 92 species. The rate of similarity between two floras is estimated by the similarity ratio, the ratio of the number of species common in these two floras to the number of all species present in them.

Surface water temperatures in February and in August, salinity, grade of water pollution, wave height and slope of the bottom bed were selected as important and numerical environmental factors for marine floras.

Results of cluster analyses using similarity ratios for floras in 44 open coastal waters are shown, connected with water temperatures in February and in August, indicating independent effects of the two temperatures on marine floras.

Ranges of all six environmental factors for the distribution of each species can be obtained by taking the lowest and the highest values of the factors from those in the waters where the species occurs commonly, eliminating some abnormal data.

The information in 5 Tables in this manuscript will make it possible

- 1) to judge rates of similarity of a marine benthic flora observed in a study to those established by similarity ratios between them;
- 2) to estimate values of environmental factors and their changes in coastal waters from species and the changes in them found in the waters;
- 3) to anticipate species and changes in species occurring in a marine flora in coastal waters, from environmental factors and changes in them, as surveyed in the waters.

Key Index Words: environmental factor—geographical distribution—marine benthic flora—marine pollution—marine topography—salinity—species composition—temperature—wave.

Shunzo Suto, Yaho 2686-12, Kunitachi-shi, Tokyo, 186 Japan.

海藻・海草植生と環境について、岡村（1931）は海流との関係を論じ、瀬川（1956）は緑藻と褐藻の種数比と、中原ら（1971）はそれに生活型も加えて、水温との関連を示し、新崎（1976）はコンブ目とヒバマタ目の種数比を海域、その水温条件の指標として提案し、同じく新崎（1984）は大型海藻・海草主体に、動物との生態関係も加えて水温との関係を論じ、谷口（1971）は干潮線付近より上の群落を優越種主体に分けて水温・塩分との対応を報じ、さらに新崎（1975）は伊勢湾・東京湾を中心に、Hirose（1978）は大阪湾等で、

海水の汚染と種の消長を報じた。種別にはアマモ、ワカメ、マコンブ、マクサ、オニクサ等がとりあげられ、それらの分布と水温の関係が報告されている。

固着生育する海藻・海草の植生はその海域の既往変化も加えた環境に強く影響され、逆の見方からはその海域環境のよい生物指標と考えられる。この意味から応用面では沿岸工事等の影響判定調査にこの植生が加えられているが、結果はほとんど役立てられていない。原因は植生と環境の関係の情報がこのような目的にはなお不十分なことがあると思われる。

ここでは、大きな地理的隔離がないと考えられる国内沿岸域の中では、植生と環境の間に比較的簡単な関連があることを予想し、集積された既往資料の照合・解析から、植生と環境の関連をよりつめて求めることを試み、上記等の応用面からの要請にもある程度応じられるようにすることを目指した。

方 法

植生を、構成する海藻・海草の種組成で表し、植生と環境の関連を、植生を構成するそれぞれの種の環境反応の総合として捉えようと考えた。種組成をとると、全国にわたって多くの既往資料を活用でき、相互の異同の程度も類似比（後述）で容易に表現できる。Setchell (1920) は外海で年間の最低期および最高期水温が海藻の種別の地理的分布を制約していると報じた。これを拡張して水温に、より局域的であるが影響の大きい数ヶの環境要因も加え、海藻・海草各種の水平分布はそれぞれの生育、繁殖への各環境要因要求の上・下限によって制約された結果と考えて、各種の分布と各沿岸域環境の照合から種別に出現域の各環境要因の範囲を求め、植生をその環境で各要因要求がすべて満足される種の集団と考えた。

なお、植生で量の要素も加えるのは、利用できる既往資料がなお少なく、植生相互の異同度の表現も容易でなく、対応する環境要因数が増え、さらに種間競争、動物による食害、病害等の影響も大きく加わり、解析が困難なので今回は見送った。

別法として、種組成と環境の関連を各 2 沿岸域の種組成の類似比（次項参照）と全環境要因の総合距離（差）の関係として捉える方法も考えられるが、全要因総合距離の求め方に問題があり、またその結果からは植生から環境の、また逆に環境から植生の具体的な推定ができないなど、結果の活用も限られると考えたので、種組成類似比と最低月および最高月水温距離の関係から、外海沿岸植生の大体の区分を求めるのに用いるだけにとどめた。

2ヶの種組成の異同の程度は千原ら (1970) および太田 (1973) にならい、類似比 similarity ratio (共通種数／総種数、以下 R の略称も使用、% で表示、太田の rate of relationship と同じ) で表すこととした。類似比の長所は直観的にわかりやすいことで、次に述べる対象選定種数の範囲では、 $R \geq 90\%$ で類似、 $\geq 80\%$ で相当似ていると見当づけられる（カイ二乗法による近似検定）。欠点は対象 2 植生の一方であげら

れた種が他方での検出に漏れた場合にはそのまま類似比低下の誤差となることである。この検出漏れによる誤差を小さくするため、千原らおよび、片田 (1975) にならい、大-中型で出現域では普通に現れ、かつ同定に困難が少ない種の中から、外海各域で 20 種以上検出されることを目標にして 92 種をとり、この選定種組成を全種組成に代えることとした。また 2 種組成の類似比を求める時、どちらか一方にでも出現が稀な種、あるいは同定に疑問のある種がある場合には、その種は類似比の算出からは除くことにした。

ここで出現が稀とは、植生資料で稀または少ないと注記されたもの、および一水域の数ヶの資料中、1ヶ～ごく少数のもののみに記載された種をいい、分布表では「？」で表した。また分布表で同定に疑問のある種は「？」で表した。

上述の種の選定の適否は結果に影響する。目的からは、環境要求の異なる種を均等にとりたいが、今はそれができないので、選定にあたっては、分類上の各部門にわたり、北方種や南方種も適当に含み、量的に大きい大型褐藻類、検出されやすい有用藻類は多く加えるようにした。今回の選定はいわば第一次試案で、目的によりよくあうよう今後の修正の必要も考えられる。

なお種名は海藻は吉田ら (1990)、海草は田中ら (1962) によった。ただし、リシリコンブとホソメコンブは分布と分布域水温の検討から川嶋 (1977) を参考してマコンブにあわせた。ナガコンブは別種との意見があるが、一応ミツイシコンブに含めた。資料のホンダワラ属の種名は Yoshida (1983) により判定した。アラメは新崎 (1985) により 2 型に分けすることが提唱されたが、既往資料との照合が困難で、それぞれの分布域の水温等の範囲が求め難い（後述の水温の項参照）ので、今回は合わせて取り扱った。また既往資料の「ヒトエグサ」について、伊勢湾とその周辺域のものは喜田 1966 に従いヒロハノヒトエグサとし、その他の内湾域と瀬戸内海のものは？とし、本邦中・南部域海域のものは疑問は残るが一応多くの既往資料にあげられたヒトエグサのままとした。

環境要因としては重要でかつ数値データがえられる水温、塩分、汚染度、波高、海底傾斜度をとりあげた。それぞれの指標値は後記する。上記以外で少数種の分布に局域的に強く影響している潮汐条件等は本文及び Table 5 で種別に注記した。光条件、栄養度、また種間競争、動物による食害等は種の水平分布への影響は一般的には小さいと考えて取り上げなかった。

それぞれの選定種の分布域の各環境要因値の範囲

を、分布と各沿岸域の環境要因値を対照して求めた。この際にも、種の出現が稀な場合、および種の同定に疑問がある場合は除外して求めるとした。

結果として、1) 任意の沿岸域の選定種組成は、その各環境要因値が分布域要因値の範囲に入るすべての種で構成され、2) 逆にある選定種組成が見られる沿岸域の各環境要因値はそれぞれ、構成各種の分布域各要因値の範囲の中の共通する部分に入り、3) また検討を省いた環境要因等による乱れは小さいことを期待した。

選定種の分布と水温

選定種の分布と水温との関係は生物、水温の長年の豊富な情報の蓄積がある外海沿岸について求めた。

外海沿岸の単位水域は県などの沿岸域とやや広くとり、波当たり、海底傾斜などが異なる水域を含むようにした。ただし環境差から、青森と鹿児島両県は東西に分け、宗谷支庁管区（以下支庁管区を省略）は東は網走、西は留萌に併せ、渡島の函館以西は檜山に含めた。また南方諸島域では諸島を単位としたが、八丈島は伊豆七島から分けた。

各単位水域での各選定種の出現如何をそれぞれの中部域主体に資料から、必要に応じ現地情報も加えて判定して Table 1 に示した。

次に各域の年間最低および最高月水温 °C（以下 2, 8 月水温という）を県内沿岸定点観測（九州西・北岸は定点が不足のため浅海定線観測で補足）の長年平均から求めて Table 2 に示し、Fig. 1 にプロットした。図で 2, 8 月水温は太平洋沿岸ではほぼ一直線上に乗っている。それに対して日本海等（日本海、オホーツク海および東支那海をいう、以下同じ）沿岸では上に外れ、特に新潟～兵庫で著しい。

Table 1 にみられる各 2 沿岸域の種組成類似比 R は平均的にはその 2 域の 2, 8 月水温距離 (d_1, d_2) として $(d_1^2 + d_2^2)$ の平方根、図上での 2 点間の距離) が小さいほど大きく、水温距離 < 1.5 ($d_1, d_2 \leq 1$) では R 平均値は 90% と高い。ただし南方諸島間およびそれらと他の沿岸域間の R のみは 70% 以下と低いが、これはおそらく珊瑚礁の状況、その他沿岸地勢の単純さなどの影響に、多少の地理的隔離、調査不十分も加わった結果と思われ、南方種の選定不適当もあるかもしれない。

各選定種別に Table 1 の分布と Table 2 の各域 2, 8 月水温を対照し、また Fig. 1 の各域 2, 8 月水温ブ




Fig. 1. Results of cluster analyses on species compositions of marine benthic floras in open coastal waters, connected with water temperatures in February and in August.

In the figure, waters are plotted by their WT in Feb. and in Aug. Next, plots of waters are enclosed by a contour line, when the floras in the waters are gathered into a cluster by cluster analyses. Thick and fine contour lines show higher and lower similarity levels of clusters, respectively.

ロットにそこで出現の有無を印して、その種分布域の 2 および 8 月水温の範囲を求めた。多くの種では判定が容易 (Fig. 2 にジョロモクの場合を例示) で、




Fig. 2. Ranges of water temperatures in February and in August found in each distribution of *Myagropsis myagroides*, a common pattern, and of *Eisenia bicyclis*, a rare one.

Table 1-1. Geographical distributions of 91 common species in marine benthic floras in open coastal waters.

Species	Geographical Distributions			
	Pacific Coast	Southern Is.	Coast of Sea of Japan, etc.	
<i>Monostroma nitidum</i>	r	c c c c c	c c c c c	Nemuro-Tokachi Pr. Hidaka Pr. Iburi Fr. Oshima Pr. E. Amami P. Iwate P. Miyagi P. Fukushima P.
<i>Ulva pertusa</i>	c c c c c c c	c c c c c c c	c c c c c c c	Ibaragi P. Chiba & Kanagawa P. Pen. Izu Mic P. Wakayama P. Kochi P. Miyazaki P. E. Kagoshima P.
<i>Dictyosphaeria cavernosa</i>	r c c c c	c c c c c c	r c r r r	Osumi Is. Amami Is. Okinawa Is. Miyako Is. Izu Is.
<i>Halicyrne wrightii</i>	r	c c		Hachijo Is. Ogasawara Is.
<i>Neomeris annulata</i>		c c c c c	c	
<i>Bryopsis plumosa</i>	c c c c c	c c r	c c c c c c c	
<i>Caulerpa cupressoides</i>		r r	r c c r c	
<i>C. okamurae</i>		c c c c c c	c c c c c c c c c	
<i>C. racemosa</i>	r r r c c c	c c c c c c	r r	
<i>Halimeda opuntia</i>	r	c c c c c	c	
<i>Analipus japonicus</i>	c c c c c c c c	c		r r c c c c
<i>Chordaria flagelliformis</i>	c c c			r r r c c
<i>Cladophoron okamurae</i>		c c c		
<i>Ishige okamurae</i>	r r	c c c c c r c c	c c	c r c c c c c c c c
<i>Nemacystus decipiens</i>		c c c r c	c c	c r c c c c c c c c
<i>Colpomenia sinuosa</i>	c c c c c c c	c c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c c c c c
<i>Scytoniphon lomentaria</i>	c c c c c c c	c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c c c c c
<i>Desmarestia viridis</i>	c c c c c c c	c r r r		r c c c c c c c c c c
<i>Alaria crassifolia</i>	c c c c c r			c
<i>A. paelonga</i>	c			
<i>Undaria pinnatifida</i>	r c c c c c	c c c c c r r		c c c c c c c c c c c c
<i>Costaria costata</i>	c c c c c c c			c c c c c c
<i>Ecklonia cava</i>		c c c c c r c		???
<i>E. kurome</i>		r r r c r r		c c c c c c c c c c
<i>E. stolonifera</i>				c c c c c c c c c r
<i>Eckloniopsis radicans</i>		c c c c c r c	c	c c
<i>Eisenia bicyclis</i>	r c c	c c c c c		r c c c c c c
<i>Laminaria angustata</i>	c c c r			r c c c c c
<i>L. japonica</i>	c c c c c c			r c c c c c
<i>Dictyota dichotoma</i>	c c c c c c	c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c c c c c
<i>Padina arborescens</i>	r r	c c c c c c	c c	c c c c c c c c
<i>P. minor</i>		c c c c c	c c c c c	c c c c c c c c
<i>Cystoseira hakodatensis</i>	c c c c c c	r		r r c c c
<i>Hormophysa cuneiformis</i>			r r c c c	
<i>Myagropsis myagroides</i>	c	c c c c c	r	c c c c c c c c c c
<i>Fucus distichus</i>	c c c c r r			c
<i>Pelvetia wrightii</i>	c c c c c r r r	r		c c
<i>Hizikia fusiformis</i>	r c c c c	c c c c c r c c	r r c c	c
<i>Sargassum confusum</i>	r c c c c r		r c c c c c c c c c c	c c c c c c c c
<i>S. duplicatum</i>		r c c c c c	c c c c	c
<i>S. hemiphyllum</i>	r	r c c c c c c	c c c c	c c c c c c c c c c
<i>S. horneri</i>	r c c c c c	c c c c c r r r	r c c c c c c c c	c c c c c c c c c c
<i>S. macrocarpum</i>	r	c c c c c c	c c r c	c c c c c c c c c c
<i>S. okamurae</i>		r c c c c c c		
<i>S. patens</i>	r	r c c c c c c	c r c c c c c c c c	c c c c c c c c c c

Coast of Sea of Japan, etc.: Coast of Sea of Japan, of Sea of Okhotsk and of East China Sea.

Table 1-2. (Continued).

Species	Pacific Coast			Southern Is.			Coast of Sea of Japan, etc.		
	Nemuro-Tokachi Pr. Hidaka Pr. Iburi Pr. Oshima Pr. E. Aomori P. Iwate P. Miyagi P. Fukushima P.	Ibaragi P. Chiba & Kanagawa P. Pon. Izu Mie P. Wakayama P. Kochi P. Miyazaki P. E. Kagoshima P.	Osumi Is. Amami Is. Okinawa Is. Miyako Is. Izu Is. Hachijo Is. Ogasawara Is.	Kumamoto P. Nagasaki P. Saga P. Fukuoka P. Yamaguchi P. Shimane P. Tottori P. Hyogo P. Kyoto P.	Fukui P. Ishikawa P. Toyama P. Niigata P. Yamagata P. Akita P. W. Aomori P. Hiyama Pr. Shiribeshi Pr. Rumoi-W. Soya Pr. Soya-Abashiri Pr.				
<i>Sargassum piliferum</i>	c c c	c c c c c c r	r r c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>S. ringgoldianum</i>	c	c c c c c c r		r c c c c c c c	r c c c c c c c c				
<i>S. sandei</i>			r c c c c	c c c c c	c				
<i>S. silicostriatum</i>	r r c c c	c c c c c r r r	r c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>S. thunbergii</i>	c c c c c c c	c c c c c c c	c c c c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>S. yezoense</i>	r r c c			c c c c c c c c r c c c					
<i>Turbinaria ornata</i>		r r r r c c c	c						
<i>Porphyra pseudolinearis</i>	c c c c c c c c	c		c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>P. variegata</i>	c c c c						c c c c		
<i>P. yezoensis</i>	c c c c c c c c	c		c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>Galaxaura fastigiata</i>		c c c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c				
<i>Acanthopeltis japonica</i>		c c c c c c r	c c c	c r					
<i>Gelidium elegans</i>	r c c c c c	c c c c c c c c	c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>G. japonicum</i>		c c c c c c c c	c c	r r r c c c c					
<i>G. pacificum</i>		r c c c c c	c c						
<i>Pterocladia capillacea</i>	r c c c c	c c c c c c c c	c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>Amphiroa dilatata</i>	r	c c c c c c c	c c	c c r c c c c c c	c c c r c c c c c				
<i>Corallina pilulifera</i>	c c c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>Constantinea subulifera</i>	c c								
<i>Neodilsea yendoana</i>	c c c c c c c c	c				r r c c c c			
<i>Gloioptellis furcata</i>	c c c c c c c c	c c c c c c c c	c c r	c c	c c c c c c c c	c c c c c c c c			
<i>G. tenax</i>		r r c c c c	c c c	c	c c c c c c c c	c c c c c c c c			
<i>Gratelouphia filicina</i>	c c c c c c	c c c c c c c c	c c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>G. turuturu</i>	r c c c c c	c c c r r	c	r r r c c c c	c c c c c c c c				
<i>Pachymeniopsis elliptica</i>	c c c c	c c c c c c c c	c c	c r c c c c	c c c c c c c c				
<i>Prionitis angusta</i>	r	c c c c c c c c	c c	c c c	r				
<i>Chondrus yendoi</i>	c c c c c c c						c c c c c		
<i>Gigartina intermedia</i>		c c c c c c c c	r r	c c	c c c c c c c c c c	c c r		cc	
<i>Rhodoglossum japonicum</i>	c c c c c c c							c c c c c	
<i>Gracilaria asiatica</i>	c c c c c c c c	c c c c c c c c	c c	c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c			
<i>Gymnogongrus paradoxus</i>	c c c c	c c c c c c	c c c	c c c			r		
<i>Plocamium telfairiae</i>	c c c	c c c c c c c c	c c c c c c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c				
<i>Eucheuma denticulatum</i>			r r	r c c c					
<i>Meristotheca papulosa</i>		c c c c c c c c	c c	c c	c c c c	r	r		
<i>Solieria pacifica</i>	r	c c c c c	r c c	c	c c c c c	c		r	
<i>Turnerella mertensiana</i>	c c	r							
<i>Lomentaria catenata</i>	c c c c c	c c c c c c c c	c c	c c	c c c c c c c c c c	c c c c c c c c c c			
<i>Campylaephora hypnaeoides</i>	c c c c c c	c c c c r c	r	c	r r r c c c c c c	c c c c c c c c c c			
<i>Ceramium kondoii</i>	c c c c c c c	c c r c	c c	r r	r c c c c c c	c c c c c c c c c c			
<i>Dasya sessilis</i>	r c c c c	c				c c c c	r	c c c c c c	
<i>Chondria crassicaulis</i>	c c c c c c	c c c c c c	r	c c	r r r c c c c c c	c c c c c c c c c c			
<i>Digenea simplex</i>			r r r c	c c c c	c c r				
<i>Neorhodomela aculeata</i>	c c c c c c	r				r	r	c c c c c c	
<i>Thalassia hemprichii</i>				c c c					
<i>Phyllospadix iwatensis</i>	c c c c c c c	c r					?	c c c c c c c	
<i>Zostera marina</i>	c c c c c c c	c c c c c c	r					c c c c c c c	

P.: Prefecture. Pr.: Province in Hokkaido.

Table 2. Surface water temperatures in February and in August in open coastal waters.

Coastal waters	WT (°C)		Coastal waters	WT (°C)	
	Feb.	Aug.		Feb.	Aug.
PACIFIC COAST					
Nemuro Pr.			COAST OF SEA OF JAPAN, ETC.		
-Tokachi Pr.	-2	16	W. Kagoshima P.		
Hidaka Pr.	0	18	Kumamoto P.	14	27
Iburi Pr.	2	20	Nagasaki P.	13	26
Oshima Pr.	4	21	Saga P.		
E. Aomori P.	5	21	Fukuoka P.	12	26
Iwate P.	6	20	Yamaguchi P.	12	26
Miyagi P.	7	22	Shimane P.	12	27
Fukushima P.	8	22	Tottori P.	11	27
Ibaragi P.	10	23	Hyogo P.		
Chiba P. &			Kyoto P.	9	26
Kanagawa P.	13	25	Fukui P.		
Pen. Izu	14	25	Ishikawa P.	8	26
Mie P.	13	26	Toyama P.		
Wakayama P.	14	26	Niigata P.	9	26
Kochi P.	15	27	Yamagata P.	8	25
Miyazaki P.	16	27	Akita P.	7	25
E. Kagoshima P.	16	27	W. Aomori P.	6	24
SOUTHERN IS.					
Osumi Is.	19	28	Hiyama Pr.	5	23
Amami Is.	19	28	Shiribeshi Pr.	5	22
Okinawa Is.	20	28	Rumoi Pr. &		
Miyako Is.	20	29	W. Soya Pr.	2	21
Izu Is.	15	25	E. Soya Pr. &		
Hachijo I.	17	27	Abashiri Pr.	-1	20
Ogasawara Is.	20	27			

P., Pr. and "Coast of Sea of Japan, etc.": see footnotes for Table 1.

WT in Feb. and in Aug.: means of many years' data at one to several stations on each coast.

Table 5 に結果を示した。

しかし、フシスジモク、エゾノネジモクでは 1) 太平洋北部・日本海北部と 2) 日本海中・南部とに分かれた 2 ケの水温範囲が判定され、いづれも水温要求の異なる 2 群を含むと考えた方がよいと思われた。またアラメでは宮城～茨城と太平洋・日本海両中・南部とに分かれた 2 ケの水温範囲が判定された (Fig. 2) が、それらは新崎 (1985) によるアラメの 2 型の分布とは一致しない。以上は Table 5 では一応 1 種として合わせた水温範囲をあげ、その範囲内で出現のない沿岸域を注記するという表現法で示した。

オオブサ等は日本海沿岸には、反対にツルアラメ等は太平洋沿岸にはみられない。またヒジキ等の潮間帶

種は本州北部の日本海沿岸では潮汐条件から適水温域でも生育していない。これらについても不出現域を注記した。

なお日本海等沿岸のクロメの分布域中、山口～長崎の資料・情報にカジメが散見されるが、その分布域水温範囲に太平洋沿岸でのそれと差がみられるなどもあってクロメの誤認との疑問を感じ、Table 1 での表示を?とした。またワカメ等少數種では内湾域資料により水温上、下限値に修正を加えた。

国内では、年間の最低月水温がウミヒルモ等 (Miki 1934), マクサ (木下 1942), ワカメ (新崎 1958), オニクサ (遠藤ら 1960) などの、最高月水温がアマモ (Miki 1933, 川崎ら 1990) の分布を制約すると報告さ

れている。2, 8月水温に代えて年平均水温をとると、太平洋、日本海等両沿岸の水温変動の差が表せなくなり、水温差と類似比の関係は乱れが大きくなり、後述する水温と植生のクラスター分析結果との照合も困難になる。海域による水温変動の違いが種の分布、植生の差に現れているので、水温条件としては少なくとも最低期と最高期水温をともにとることが必要と考える。

Table 5 にあげたのは国内の外海域主体での海藻・海草各種の分布域水温値の範囲であり、2月、8月水温間の相関の影響も加わっているが、国外のより低い・高温域にも分布する種を除いて、多くの場合、それぞれの種の分布を制約する水温値に近いものと思われる。なお上記国内報告での分布域水温上・下限値は Table 5 のそれらの数値とはほぼ一致している。

別に、外海各域間の種組成類似比を最長距離法中心に、重心法、メジアン法も併用して、クラスター分析した。結果から Fig. 1 で、種組成が 3 方法ではほぼ共通して同じクラスターにまとめられた海域の 2, 8月水温プロットを、類似レベルが高いほど太い線で囲んだ。これからも一般的には 2, 8月水温が近い海域の種組成が似ているのがみられる。沿岸域を種組成の類似度から大きく分けると、1) 根室～日高、網走～留萌、胆振・渡島、2) 後志・檜山、青森東～宮城、福島、茨城、3) 青森西、秋田～福井、兵庫、京都、鳥取～佐賀、4) 千葉～三重、和歌山・高知、宮崎、鹿児島東、同西、熊本・長崎、伊豆七島、八丈島、大隅・奄美諸島、5) 沖縄・宮古諸島、小笠原諸島となった。類似比からこの結果は岡村 (1936), 濱川 (1956), 新崎 (1976) らの海藻分布の区分と大差はないが、ただ金華山を境とする差が小さく、代わって犬吠岬での差が大きく出ている。これは両者を境とする沿岸域の水温距離差の反映でむしろ妥当ではないかと思われる。

選定種の分布と塩分、汚染度、波高、海底傾斜度

小沿岸域別に種組成と表記に 2月水温も加えた 5 環境要因値のデータをほぼ共に入手できた大阪湾東岸、英虞湾、伊勢湾、東京湾口の計 27 小域での選定種組成 (Table 3) と 5 環境要因値 (Table 4) を照合して、種別に分布域要因値の範囲を求めた。なお 8 月の水温はこれらの海域ではほとんどの出現種の分布を制約していないと認めて省いた。

2月水温、塩分、汚染度の指標値には浅海定線観測などから植生調査域に近い測点の 2月 WT °C、全年

Cl %、全年 COD_{OH} (アルカリ性での KMnO₄、100°C, 20 min による COD (JIS K 0102), 以下 COD という) mg/l の 5~20 年平均値をとった。波高は域内または至近漁港の設計沖波波高 m (以下で H_{1/3} の略称も使用) を指標値とした。ただし、大阪湾内は関西空港環境影響調査の最大有義波高で代え、() をつけて示した。海底傾斜度は海図で水深 10 m 線の距岸距離 (湾奥では 5 m 線のそれの 2 倍、埋め立てなどがある時はそれ以前の推定距離) を km 単位で求めて指標値とし、D で示した。各沿岸域のこれらを Table 4 にあげた。ただし一部は推定値により、() を付して示した。

ここで、定線観測は 2 (または 1) ヶ月に 1 回だけなので、WT, Cl, COD 各指標値の精度は高いとはいえないし、Cl 値は植生に影響が大きい出水時の低塩分値と、COD 値は同じく夏の高 COD 値と相関はあるが十分とはいえない。設計沖波波高は水深や地形で複雑に変化する生育現場の波高と違うし、最荒天時の有義波高がふだんの波高の数倍にもなる、などの問題があるが、データ入手の制約から今回はこれらの指標値で我慢せざるをえなかった。なお波と流れを合わせた海水流動の指標値として半球形石膏の減重速度が用いられ、小域内で海藻種別分布とのよい対応が見られた (川井ら 1982, 太田ら 1990) が、その広域的適用は困難と思われ、また流れは資料不十分なので、今回は見送った。海底傾斜度はふつう急であれば岩底、緩やかであれば砂底と底質の大略の指標である。

なお、Cl は種別分布域の下限値のみを、COD は上限値のみを求める、Cl の上限値、COD の下限値はふつう外海での値なので省いた。H_{1/3} は下限値を求めた。波高がその種の要求する波の強さ以下の所にはその種は分布しないからである。生育域では沖波が水深、地形により弱められるため、沖波が強くても、波の蔭になる所には弱い波を要求する種も生育しうるので、上限値はデータからは求まらない。なお外海開放域の H_{1/3} はふつう 8~11 m である。D は上限値のみを求める、下限値はデータからは求まらなかった。

各選定種別に、その分布域の各環境要因の上・下限値を前記 4 内湾での分布 (Table 3) と各域環境要因指標値 (Table 4) を照合して求めて Table 5 に示した。4 内湾を併せることにより、要因値のより範囲の広い組み合わせが多数得られて上・下限値をよりつめて求められると共に、要因間の相関の影響を著しく低められることを期待した。しかしながら資料数の不足と、要因間にまだ残された相関から、表示の上・下限値は今後

Table 3. Geographical distributions of 52 common species in marine benthic floras in the four inland seas fully investigated and those in the Seto Inland Sea.

Area A to D' in Ago Bay: see Maegawa *et al.* 1982.

Table 4. Five environmental factors for marine benthic floras in four inland seas fully investigated and those in the Seto Inland Sea.

Coastal waters	WT (°C) in Feb.	Cl (‰)	COD _{OH} (mg/l)	H _{1/3} (m)	D (km)
OSAKA BAY					
Kada	10.5	17.8	1.1	11	0.25
Kojima	9.9	17.6	1.4	(2.1)	0.3
Tan-no-wa	8.8	17.4	1.5	(2.2)	0.9
Ozaki	9.0	17.3	1.9	(2.3)	0.9
Kaizuka	8.7	17.0	2.2	(2.3)	2.2
AGO BAY					
Area A, mouth	13.5	18.0	1.1		0.2
Area B	13.0	17.8	1.2		0.3
Area C	12.3	17.8	1.2	1.4	0.25
Area D	11.1	17.3	1.3	(<1.0)	0.15
Area D', bottom	10.6	16.5	1.3	(<1.0)	0.8
TOKYO BAY					
Jo-ga-shima I.	13.0	18.7	1.0	9	0.25
Matsuwa	13.1	18.5	1.2		0.3
Kamoi	10.6	18.2	1.3		0.4
Hashirimizu	9.8	17.8	1.6		0.4
ISE BAY					
Suga-shima I.	10.2	17.1	0.7	6	0.3
Ise	6.8	15.8	1.6	2.7	1.6
Matsusaka & Tsu	7.1	14.7	2.2	2.8	0.8
Yokkaichi	8.4	13.1	2.0	2.8	1.6
Shin-maiko	8.4	13.1	2.1	2.0	1.2
Toyohama	8.9	16.6	1.1	2.5	0.3
Shino-jima I.	7.3	16.8	1.2	2.6	0.4
Pt. Irago	9.5	17.3	0.8	8	0.2
Saku-shima I.	7.3	16.9	1.2	2.5	0.4
Ooi	(8.0)	16.7	1.7	1.8	0.4
Nishio	(8.0)	15.0	1.8	1.5	1.9
Isshiki	8.0	16.0	1.8	1.7	2.4
Oki-no-shima I.	6.0	16.8	1.7	2.0	0.8
SETO INLAND SEA					
Kii Channel	11	18	0.9	5-6	
Osaka Bay	9	17	1.8	2.5	
Sea of Harima	8.5	17.5	2.1	3	
Bisan Channel	8.5	17.5	1.3	2	
Sea of Hiuchi	8.5	17.5	1.5	3	
Sea of Aki	10	18	1.0	2	
Sea of Suo	8	18	0.9	(3)	
Sea of Iyo	10	18	1.2	3-4	
Bungo Channel				5-6	

Area A to D' in Ago Bay: see Maegawa *et al.* 1982.

WT, Cl and COD_{OH}: means of 5-20 years' data at the nearest station in oceanographical investigations.

COD_{OH}: COD by alkaline KMnO₄, 100°C, 20 min (JAS K 0102, 1986).

H_{1/3}: the max. significant offshore wave height set in planning fishing ports on each coast.

D: offshore distance (km) of the 10 m depth.

Numbers in () are estimated values.

Table 5-1. Ranges of six environmental factors in coastal waters for each distribution of 92 common species in marine benthic floras.

Species	Ranges of environmental factors						Remarks
	WT (°C)	Cl (%)	COD _{OH} (mg/l)	H _{1/3} (m)	D (km)		
	Feb. L-U	Aug. L-U	L	U	L	U	
<i>Monostroma latisimum</i>	7- 14		16.5	1.3	(1)	.8	A) in and around Ise Bay
<i>M. nitidum</i>	12- 20	25-29					
<i>Ulva pertusa</i>	-2- 20	16-29	13.1	2.2	(1)	2.4	S) on sandy bed also
<i>Dictyosphaeria cavernosa</i>	13- 20	25-29					
<i>Halicyrone wrightii</i>	19- 20	28-28					
<i>Neomeris annulata</i>	16- 20	27-29					
<i>Bryopsis plumosa</i>	0- 19	18-28	13.1	2.2	1.5	2.4	
<i>Caulerpa cupressoides</i>	17- 20	27-28					
<i>C. okamurae</i>	6- 20	24-27	17.3	1.2	(3)	.3	
<i>C. racemosa</i>	14- 20	25-29					
<i>Halimeda opuntia</i>	19- 20	27-29					
<i>Analipus japonicus</i>	-2- 10	16-23			(2)		
<i>Chordaria flagelliformis</i>	2- 3	16-21			(3.5)		
<i>Cladosiphon okamuranus</i>	19- 20	28-29					
<i>Ishige okamurae</i>	7- 19	23-28	16.8	1.3	1.4	.4	T) scarce in IK-AT in JC
<i>Nemacystus decipiens</i>	8- 19	25-28	13.1	2.1	2.0	1.6	S) on sargasso plants
<i>Colpomenia sinuosa</i>	-2- 20	16-29	13.1	2.2	(1)	2.4	
<i>Scylosiphon lomentaria</i>	-2- 20	16-28	13.1	2.2	(1)	2.2	
<i>Desmarestia viridis</i>	-2- 12	16-27	13.1	2.2	2.0	1.2	
<i>Alaria crassifolia</i>	0- 6	18-21			(3.5)		U) not found in JC
<i>A. praelonga</i>	-2- 1	16-20					
<i>Undaria pinnatifida</i>	2- 14	20-27	13.1	2.2	1.8	1.6	
<i>Costaria costata</i>	-2- 7	16-24			(2.5)		
<i>Ecklonia cava</i>	10- 16	23-27	17.1	1.3	6	.4	
<i>E. kurome</i>	8- 14	26-27	17.6	1.4	(2.1)	.3	
<i>E. stolonifera</i>	6- 13	24-27					U) not found in PC
<i>Eckloniopsis radicans</i>	13- 19	25-28					
<i>Eisenia bicyclis</i>	7- 14	22-27	16.6	1.6	2.5	.4	U) missing in KT-AT in JC
<i>Laminaria angustata</i>	-2- 2	16-20					U) not found in JC
<i>L. japonica</i>	-1- 8	20-24			(2.5)		
<i>Dictyota dichotoma</i>	-1- 20	20-29	16.8	1.3	(1)	.4	
<i>Padina arborescens</i>	6- 19	24-28	16.6	1.6	(1)	.4	
<i>P. minor</i>	11- 20	26-29					
<i>Cystoseira hakodaiensis</i>	-2- 7	16-24					
<i>Hornophysa cuneiformis</i>	19- 20	28-29					
<i>Myagropsis myagroides</i>	6- 15	22-27	16.6	1.7	2.0	.9	
<i>Fucus distichus</i>	-2- 4	16-21			(1.5)		
<i>Peltelia wrightii</i>	-2- 6	16-21			(2.5)		
<i>Hizikia fusiformis</i>	5- 20	20-28	16.6	1.6	1.4	.4	T) missing in TY-AM in JC
<i>Sargassum confusum</i>	-1- 13	20-27			(1.8)		U) missing in IG-ME in PC
<i>S. duplicatum</i>	13- 20	25-28					U) missing in KM-NS in JC
<i>S. hemiphyllum</i>	7- 19	25-28	16.6	1.3	2.5	.4	
<i>S. horneri</i>	4- 19	20-28	14.7	2.2	(1)	2.2	
<i>S. macrocarpum</i>	6- 19	24-28	17.1	1.4	(2.1)	.4	
<i>S. okamurae</i>	13- 16	25-27	17.1	1.2	6	.3	U) not found in JC
<i>S. patens</i>	6- 20	24-28	16.5	1.3	(1)	.8	

WT: see footnote for Table 2. Cl, COD_{OH}, H_{1/3}, and D: see footnotes for Table 4. L and U: lower and upper limits. Numerals in (): uncertain values.

A): area where the alga was found by Kida (1966). S): substrata except rocky bed. T): missing locally due to unsuitable tidal conditions. U): missing locally due to indefinite reasons.

Table 5-2. (Continued).

Species	Ranges of environmental factors						Remarks
	WT (°C)		Cl (‰) L	COD _{OH} (mg/l) U	H _{1/3} (m) L	D (km) U	
Feb. L-U	Aug. L-U						
<i>Sargassum piliferum</i>	5-16	20-27	16.5	1.3	(1)	.8	
<i>S. ringgoldianum</i>	7-16	22-27	17.1	1.3	(4)	.4	
<i>S. sandei</i>	14-20	25-28					U) not found in JC
<i>S. siliquastrum</i>	5-15	20-27	16.8	1.4	(2.1)	.4	
<i>S. thunbergii</i>	-2-20	16-28	15.8	1.7	(1)	1.6	
<i>S. yezoense</i>	2-13	20-27			(2)		U) missing in FS-ME in PC
<i>Turbinaria ornata</i>	19-20	27-29					
<i>Porphyra pseudolinearis</i>	-2-12	16-27			(2.5)		
<i>P. variegata</i>	-2-5	16-23					
<i>P. yezoensis</i>	-2-13	16-27			(2.5)		
<i>Galaxaura fastigiata</i>	8-20	25-29	17.8	1.2	(4)	.3	
<i>Acanthopeltis japonica</i>	13-19	25-28	17.1	1.2	6	.3	U) not common in JC
<i>Gelidium elegans</i>	2-19	20-28	15.8	1.7	(1)	1.6	
<i>G. japonicum</i>	10-19	23-28	16.8	1.2	2.6	.4	
<i>G. pacificum</i>	13-17	25-27	17.1	1.2	6	.3	U) not found in JC
<i>Pterocladia capillacea</i>	2-19	20-28	16.8	1.3	(1)	.4	
<i>Amphiroa dilatata</i>	6-19	24-28	16.8	1.2	2.6	.4	
<i>Corallina pilulifera</i>	-2-20	16-29	16.6	1.7	1.4	.8	
<i>Constantinea subulifera</i>	-2-0	16-18					
<i>Neodilsea yendoana</i>	-2-10	16-23			(1)		
<i>Gloiopeletis furcata</i>	-2-19	16-28	15.8	1.7	(1)	1.6	
<i>G. tenax</i>	10-19	25-28	16.8	1.2	2.6	.4	
<i>Grateloupia filicina</i>	2-20	20-28	13.1	2.2	1.4	2.4	
<i>G. turuturu</i>	-1-15	20-27	13.1	2.2	1.7	2.4	
<i>Pachymeniopsis elliptica</i>	5-17	20-27	16.6	1.7	2.0	.8	
<i>Prionitis angusta</i>	13-20	25-28	17.1	1.2	(4)	.3	
<i>Chondrus yendoi</i>	-2-7	16-24			(2)		
<i>Gigartina intermedia</i>	5-17	20-27	15.8	1.7	2.0	1.6	T) missing in MG-AM in JC
<i>Rhodoglossum japonicum</i>	-2-7	16-24			(1.5)		
<i>Gracilaria asiatica</i>	-2-19	16-28	13.1	2.2	(1)	2.4	
<i>Gymnogongrus paradoxus</i>	5-20	20-27	16.8	1.6	2.5	.4	U) not found in JC
<i>Plocamium telfairiae</i>	6-20	20-29	16.6	1.6	(2.1)	.9	
<i>Eucheuma denticulatum</i>	19-20	28-29					
<i>Meristotheca papulosa</i>	12-19	25-28	17.1	1.2	(4)	.3	
<i>Solieria pacifica</i>	11-19	25-28	16.8	1.6	2.6	.4	
<i>Turnerella mertensiana</i>	-2-0	16-18					
<i>Lomentaria catenata</i>	4-19	20-28	15.8	1.6	(1)	1.6	
<i>Campylaephora hypnaeoides</i>	-1-15	18-27	16.6	1.2	2.5	.4	S) on sargasso plants
<i>Geranium kondoi</i>	-2-16	16-27	16.8	1.3	2.5	.4	
<i>Dasya sessilis</i>	2-12	20-27					
<i>Chondria crassicaulis</i>	2-17	20-27	16.6	1.7	2.0	.8	
<i>Digenea simplex</i>	16-20	27-29					
<i>Neorhodomela aculeata</i>	-2-8	16-25			(1)		S) on coral reef and sand
<i>Thalassia hemprichii</i>	19-20	28-29					
<i>Phyllospadix iwatensis</i>	-2-10	16-26					
<i>Zostera marina</i>	-2-16	16-28	13.1	2.2	(1)	2.4	S) on sandy mud

PC: Pacific coast. JC: Coast of Sea of Japan, of Sea of Okhotsk and of East China Sea.

AB: Abashiri Pr., AM: Aomori P., AT: Akita P., FS: Fukushima P., IG: Ibaragi P., IK: Ishikawa P., KM: Kumamoto P., KT: Kyoto P., ME: Mie P., NG: Niigata P., NS: Nagasaki P., TY: Toyama P., (P.: Prefecture, Pr.: Province in Hokkaido).

情報の充足によりある程度修正される可能性を残していると考えられる。なお、上・下限値に Table 4 中の推定値を用いた場合、および他域の情報で補足したフサイワヅタの $H_{1/3}$ などの少数の要因推定値も Table 5 に()を付して加えた。

ヒロハノヒトエグサの要因値は分布が確認された伊勢湾およびその近傍域のみで求めた。また大阪湾内の資料に散見されるマフノリおよびカジメは同定に疑問を感じ、さらにそれらの分布域の 2 月水温、塩分、 $H_{1/3}$ などが、同定が確実な他の分布域でのそれらの範囲から外れると見られたことから、Table 3 の表示を?とし、Table 5 の要因値はこれらを除いて求めた。

伊勢湾など 4 内湾に分布しない種については情報不足から分布域の 4 要因値の範囲を求められなかった。ただ一部北方種の $H_{1/3}$ の概要だけを次の方法で推定し、()を付して補足した。それは、近くで波の強さのみが異なる 2 小域での種組成を北海道および三陸の資料から抽出し、結果を整理して種を分布域の波の強さで順序付け、その中の $H_{1/3}$ が既知の種と比べて、陸奥湾での $H_{1/3}$ と種の分布の情報も参照して、北方種の $H_{1/3}$ を見当付けるという方法である。

Table 3, 4 に瀬戸内海の灘等別の種の分布と環境要因平均値も付記したが、種の分布域の環境要因値の参考とするにとどめた。

結果と考察および結果の活用

日本の沿岸の中では大きな地理的隔離は見られない、各沿岸域を通して海藻・海草植生と環境との間に比較的簡単な関連があることを予想し、その関連を、既往情報の再検討から、従来よりつめて求めることを試みた。

各沿岸域の海藻・海草植生の指標として、豊富な分布資料の蓄積があり、検出、同定が容易と思われた 92 の普通種を選定してその種組成をとった。県等の中部域とやや広くとった外海各沿岸域の種組成を Table 1 に、小域別にはば充分な資料が得られた伊勢湾等 4 内湾各小域の種組成に、参考として瀬戸内海の各灘等とやや広域の平均的なそれも付加して、Table 3 に示した。

2-種組成の異同度の判定には両者の類似比を用いた。類似比の算出にあたっては、2-種組成の何れか一方にでも出現が稀、または同定に疑問のある種がある時はその種を除いて行った。

種の分布、従って種組成に關係する重要でかつ数値

データがえられる環境要因として、水温、塩分、汚染度、波高および海底傾斜度をとりあげ、それぞれの指標値として、年間の最低および最高月水温 °C (以下 2, 8 月水温という)、年平均 Cl %、同 COD_{OH} (前章参照、以下 COD という) mg/l、域内または至近漁港の設計沖波波高 $H_{1/3}$ m、水深 10 m 線の距岸距離 D_{km} を用い、種組成表示域でのそれらの数値を Table 2, 4 に示した。

各選定種の分布域の 2, 8 月水温の範囲は主として外海沿岸で、他の 4 要因の範囲は伊勢湾等の 4 内湾で、分布と分布域要因値を対照して求め、Table 5 にまとめた。この際、出現が稀な場合、あるいは同定に疑問がある場合は除外して行った。Cl % の上限、COD の下限は一般に外海での値なので省略した。 $H_{1/3}$ の上限、 D の下限はこの資料からは求まらず、表記できなかった。また 4 内湾に出現しない種の水温以外の 4 要因値は資料が得られず、一部の北方種の $H_{1/3}$ の下限だけを不十分な推定値で加えた以外は空欄として残し、今後の資料の追加による充足に期待することとした。

大多数の種は表示の条件を満足する沿岸域のほとんど全部に出現しているが、少数の種ではその一部、あるいは相当数の沿岸域群に分布しない場合が見られた。外海域での顕著な例として、ツルアラメなどは太平洋沿岸には分布しない、ヒシキなどは潮汐条件から本州北部日本海沿岸では出現しない (斎藤 1972)、アマモは内湾砂泥地がないと生育しない、などが挙げられる。これらとは別に、フシスジモク、エゾノネシモク、アラメなどはおそらく温度要求の異なる 2 (以上) ケの群が含まれていると思われ、それを 1 種としてまとめた水温範囲内の沿岸域では分布しない部分が見られる。こうした少数の例外は Table 5 に種別に注記を加えて示した。

なお資料で九州北岸および大阪湾等のクロメ分布域中に散見される「カジメ」、また大阪湾等の「マフノリ」は同定に疑問を感じ、各環境要因の範囲を求める際にはこれらは除外した。ヒロハノヒトエグサの要因値は分布が確認されている伊勢湾及びその近傍域のみから求めたが、その他の沿岸域に見られる既往資料の「ヒトエグサ」はなお分類上の検討を要するように思われ、その結果によっては両種の分布、したがって要因値の修正を要することも考えられよう。

Table 5 のチェックもかねて、逆にその種別の 2, 8 月水温範囲と Table 2 の水温を照合し、注記で必要な一部修正をして、外海沿岸各域の種組成を推定し、

それらのTable 1の種組成の再現度を類似比で試算すると平均で95%と高い。各県等の中北部域と沿岸域をやや広く取ると、低塩分、高汚染度の影響はほとんどなく、波の不足もなく、種々の地形が含まれるので海底傾斜度の制約もなく、その種組成は主として水温に左右されていると見られる。例外的に八丈島、小笠原諸島では70%台と低いが、その原因としては単調な地形等の影響が、小笠原諸島ではさらに植生の調査不十分も考えられる。

またTable 5とTable 4を照合して伊勢湾等4内湾各小域の種組成を推定し、それらのTable 3の種組成の再現度を類似比で試算したが、平均で86%とやや低かった。主因は湾奥数域で類似比が著しく低いことで、ここで用いた手法の湾奥の局域的な植生・環境の変化への対応不十分が認められた。なお水温以外の4要因を1ヶづつ除いた試算では類似比は何れでもほぼ10%低下し、各要因の寄与が認められた。

これらの結果を一般化して、海藻・海草の各選定種は、各環境要因値がTable 5に表示した範囲内の沿岸域には、注記した少数の例外を除いて、大多数の場合にはふつうに出現し、範囲を外れた環境の沿岸域には多くの場合出現しないか、出現しても稀であると考えてよいであろう。表示した数値は既往資料から各種が普通に出現すると見られた沿岸域の各環境要因値の上・下限であり、各環境要因間の相関が、2、8月水温では太平洋、日本海等のそれらを併せ、CI等4要因では4内湾の資料を併せるなどで軽減させる努力をしたにも関わらず、なお残って影響している可能性もあるが、国外のより北方、南方域にも分布する種の水温値を除いて、多くの場合にその種の生育、繁殖のための環境要因要求の上・下限値に近いものと思われよう。はじめに植生と環境の間に比較的簡単な関連を予想したが、それは国内沿岸域間では、そこで生育、繁

殖のための各環境要因要求が共通に満足させられる種が共通に出現すると表現できるであろう。

ただし、 $H_{1/3}$ の上限とDの下限は求まらず、Table 5に表示できなかった。このため地形の単調な小沿岸域では、波が強すぎて、または傾斜が急すぎて生育しない種があることの情報が欠けている。また伊勢湾等の4内湾に分布しない種について、水温以外の要因の分布域上・下限値のほとんどが空欄で残され、これらの要因の制約による不出現の情報も欠けていることになる。

以上とは別の環境と種組成の関連を求める方法として、水温については、外海沿岸域で2域の2、8月水温距離が小さいほど、種組成の類似比が平均的に高いこと、また各域の2、8月水温の分布と各域種組成の類似比によるクラスター分析の結果がよく対応することが見られた。クラスター分析の結果は岡村(1931)、瀬川(1965)、新崎ら(1976)による海藻分布の区分と、金華山を境とする差より犬吠岬でのそれが、両者を境とする沿岸域の水温距離の差を反映してより大きい(Fig. 1)こと以外は、ほぼ類似している。なお各2沿岸域の種組成の差と環境差の関係を、種組成類似比と水温以外の要因も加えた環境要因総合距離(差)との関係として捉えるのは、各要因指標値の合目的的な変換が困難であることなどから今はできなかった。

Table 5の種分布域の各環境要因値の範囲、Table 1 and 3の各沿岸域の種組成、類似比による種組成の異同度の判定を併せると、植生の、また環境の調査結果から次のような判定、推定等ができる場合が多いと考える。ただし上述したTable 5の情報不足から一部の不出現種を出現種に加えてしまうなどの誤りが入る可能性が残されている。

a) 調査種組成の位置づけ：調査で得られた種組成を既知の各沿岸域種組成と対比し、大きい類似比を与

Table 6. Two examples of similarity ratios (R%) between species composition of marine benthic flora on a coast surveyed and that in its adjacent waters, established in Tables 1 and 3.

Area searched	Coastal waters with established floras		
	Around the area searched		Neighboring the area searched
Off Ikata power station, Ehime P.	Sea of Iyo	83	Sea of Aki 56 Sea of Suo 55 Bungo Channel 73
Off Kyowa-Tomari power station, Shiribeshi Pr.	Shiribeshi Pr.	64	W. Soya & Rumoi Pr. 61 Hiyama Pr. 65 W. Aomori P. 50

P.: Prefecture, Pr.: Province in Hokkaido.

Table 7. Estimations of environmental factors in two coastal waters from marine benthic floras found in them, compared with those observed in surveys.

Area searched		WT (°C)		CL (%)	COD _{OH} (mg/l)	H _{1/3} (m)	D (km)
		Feb.	Aug.				
Off Ikata power station, Ehime P.	Est.	12-13	26-27	≥18.2	≤1.1	≥4	≤0.4
	Obs.	12.2	—	18.6	0.8	4	0.1
Off Kyowa-Tomari power station, Shiribeshi Pr.	Est.	4-7	20-25	≥16.5	≤1.2	≥3	≤0.4
	Obs.	5.1	21.1	18.5	0.7	(8)	0.3
Off Nanao power station, Ishikawa P.	Est.	8-14	23-28	≥16.8	≤1.2	≥2.5	≤0.5
	Obs.	7.2	27.4	17.4	1.0	(≤3)	—

P.: Prefecture, Pr.: Province in Hokkaido.

Est. WT, etc.: Ranges of each factor, commonly satisfying demands (cf. Table 5) of all species in the area investigated.

Obs. WT, etc.: in surveys conducted throughout one year.

Numbers in () are uncertain values.

えるそれに近いと位置づけできる。Table 6 に環境影響判定調査の2事例をあげた。伊方および共和・泊発電所近辺海域の種組成は周辺の伊予灘および後志・檜山沿岸域の種組成との類似比がそれぞれ83%および64~65%と最も高い。なお泊地先関連の類似比が60%台と低いのは、外海に面した単調な小沿岸域で波陰がないため、一部のホンダワラ類、ツルヅルなど相当数の波に弱い種が出現しないことが主因と考えられる。別に七尾発電所の同調査での近辺域（七尾南湾）の種組成は石川県外海域の種組成から $H_{1/3} \geq 3$ m と波要求の強い種を除いたものとの類似比が82%と最も高い。

b) 調査種組成から環境の推定：調査域で全出現種に共通な分布域環境要因値の範囲を Table 5 から抽出してそこの環境要因値を推定できる。種組成と環境要因値がともに求められた3調査事例について、種組成からの環境要因推定値に実測値を対比して Table 7 にあげた。

c) 環境からの種組成の推定：環境調査結果と Table 5 を照合してそこでの出現種を推定できる。植生も相当よく調査された上記伊方および七尾発電所周辺海域について、Table 7 の環境値（七尾の $H_{1/3}$ は湾口も含めて <3 m とした）から種組成を推定し、調査種組成との類似比を求めてそれぞれ83%，82%がえられた。別に淡路島岩屋で浅海定線観測等による環境値（2月WT: 9.3°C, Cl: 17.6‰, COD: 1.1 mg/l, $H_{1/3}$: 3.1 m, D: 0.3~0.7 km）からの推定種組成と資料（広瀬ら1965）による種組成との類似比は81%であった。何れでも調査結果と推定の違いの主体は一部の出現推定種が調査では検出されていないことにあった。

d) 環境変化による種組成変化の予想：環境要因の変化予測値と表5から消失種および新出現種を予想できる。ただし種の新規の出現、繁殖にはある程度の期間を要する場合が少なくないであろう。適切な事後調査事例が見当たらず、この予想の例示とチェックができなかった。

謝 辞

各地の種組成、環境について多くの方々から貴重な御意見、御教示、情報の御提供を頂きましたことを深謝いたします。

参 照 資 料

（海藻・海草分布）

広 域：

- 新崎盛敏 1985. 海洋科学 17: 760-768.
 Miki, S. 1933. 植雜 47: 842-862.
 岡村金太郎 1936. 日本海藻誌. 内田老鶴園.
 瀬川宗吉 1956. 原色日本海藻図鑑. 保育社.
 Tanaka, T. ら 1962. Acta Phytotax. Geobot. 20:
 180-183.
 谷口森俊 1961. 日本の海藻群落学的研究. 井上書店.
 Yoshida, T. 1983. 北大理紀要（欧文）V 13: 99-246.

北海道：

- 千原光雄 1972. 科博専報 5: 151-162.
 福原英司 1959. 北水試月報 16: 36-42, 同 1959.
 同 16: 76-78, 同 1968. 北水研報 34: 40-99.

- 長谷川由雄 1950. 北水試研報 7: 68-75, 同 1951. 北水研報 1: 52-60, 同 1959. 北水試月報 16: 201-206.
- 北大海藻研 1983. p. 52-60. 要覧. 北大海藻研.
- 稻垣貫一 1933. 北大海藻研報 2: 1-77.
- Iwamoto, K. 1960. 東水大紀要 46: 21-49.
- 金子 孝ら 1970. 北水試月報 27: 167-178.
- 名畑進一 1985. 藻類 33: 75-76.
- 川端清策 1959. 北海道学芸大紀要 10: 285-296.
- Saito, Y. ら 1970. 北大水産研報 21(2): 37-69, 同 1971. 日生態誌 20: 230-232, 同 1974. 北大水産研報 24(4): 133-138.
- Sakai, Y. 1986. 北大海藻研歐文報 8: 1-61.
- Tokida, J. ら 1959. 北大水産研報 10(3): 173-195.
- Yamada, I. 1980. 北大理紀要 V 2: 13-98.
- Yamada, Y. ら 1942. 北大海藻研報 3: 47-77.
- 青森(東)～茨城:
- 千原光雄ら 1968. 科博専報 68: 153-160.
- 川端清策 1939. 植動 7: 1563-1567.
- 川嶋昭三 1954. 藻類 2(3): 61-66, 同 1955. 同 3(2): 29-35.
- 黒木宗尚ら 1980. 海洋研臨海センター報 5: 25-35.
- 中庭正人 1975. 藻類 23: 99-110.
- 七尾善磨 1974. 藻類 22: 29-38.
- Noda, M. 1964. 新潟大理紀要 II 4: 33-75.
- 野田光蔵 1964. 藻類 12: 61-71.
- Ogawa, H. ら 1970. 東北大農研報 27: 145-154.
- Takamatsu, M. 1936a. 斎藤報恩会博報 8: 1-44, 同 1936b. 同 8: 45-70, 同 1938. 同 14: 77-143.
- 高松正彦 1974. 原色海藻図譜. 北里大水産.
- 千葉～三重:
- 阿部秀直ら 1972. 海中公園センター調査報告 31: 51-71.
- 千原光雄 1965. p. 4-18. 銚子の自然. 銚子市観光協会.
- 千原光雄ら 1960. 千葉大文理紀要 3(2): 163-171.
- 東道太郎 1935. 水研誌 30(2/3): 1-19.
- 喜田和四郎 1967. 日本自然保護協会調査報告 31: 105-117, 同 1979. 海中公園センター調査報告 68: 145-160.
- 湖城重仁 1963. 三重生物 13: 5-11.
- Segawa, S. 1935. 北大海藻研報 1: 59-90.
- 瀬木紀男 1951. p. 340-352. 三重生物目録. 三重大水産.
- 谷口森俊 1966. 日生態誌 16: 22-24.
- 和歌山～鹿児島(東):
- 喜田和四郎 1965. 日本自然保護協会調査報告 14: 5-22.
- 南西水研 1979. (瀬戸内海参照).
- 玉井清夫 1977. 日本自然保護協会調査報告 59: 66-71.
- 田中剛 1967. 日本自然保護協会調査報告 30: 17-34.
- 山本虎夫 1966. 日本自然保護協会調査報告 27: 103-108.
- 吉崎 誠 1981. 藻類 29: 51-52.
- 南西諸島:
- 赤塚伊三武 1973. 藻類 21: 39-42.
- Kida, W. 1964. Rep. 三重大水産 5: 217-231.
- 野沢ユリ子 1972. 鹿児島純心女短大紀要 2: 56-66.
- 瀬川宗吉ら 1960. 琉球列島海藻目録. 琉球大.
- 田中剛 1956a. 鹿児島大南方産業科研報 1(1): 13-16, 同 1956b. 同 1(3): 13-22.
- 田中剛ら 1962. 鹿児島大南方産業科研報 3(2): 105-111.
- 谷口森俊 1979. 三重大環境科学研究紀要 4: 93-121.
- 当真 武 1991. 水産増殖 39: 47-54.
- 当真 武ら 1978. 沖縄水試資料 28: 1-25, 同 1984. 同水試報告, 昭57: 163-180. 同 1990. 同 昭63: 129-137.
- 伊豆諸島～小笠原諸島:
- 新崎盛敏 1974. 海中公園センター調査報告 48: 57-73.
- 加崎英男ら 1972. p. 71-86. 小笠原諸島生物相調査報告. 東京都大理.
- 喜田和四郎 1961. p. 35-52. 式根島調査報告. 烏羽水族館.
- Okamura, K. 1930. Rec. Ocean. W. Jap. 2: 92-110.
- 九州西・北岸:
- 新崎盛敏 1970. 海中公園センター調査報告 18(1): 35-44, 同 1971. 同 23: 77-86.
- 千原光雄ら 1970. 科博専報 3: 143-158.
- Migita, S. ら 1961. 長崎大水産研報 10: 174-185.
- 瀬川宗吉ら 1959. 九大農学芸雑誌 17: 83-89.
- 瀬川宗吉ら 1961. 天草臨海実験所近海の生物相 3. 九大臨海実.
- 谷口森俊 1960. 日生態誌 10: 137-140.
- 山田 徹ら 1981. 藻場・干潟分布調査. 佐賀水試.
- 吉田忠生 1961. 日生態誌 11: 191-194.
- 山口～福井:
- 秋山 優 1971. 海中公園センター調査報告 23: 15-30.
- 東道太郎 1936. 水研誌 31: 290-298.
- 広瀬弘幸 1958. 兵庫生物 3: 265-268.
- 広瀬弘幸ら 1966. p. 45-70. 山陰海岸国立公園調査報告. 建設工学研.
- 広瀬弘幸ら 1973. 藻類 21: 33-38.
- Ikoma, Y. 1956a. 鳥取大 Liberal Arts J. 7: 22-29, 同 1956b. 同 8: 14-23.
- 生駒義広 1970. 海中公園センター調査報告 17: 32-53.
- 今野敏徳ら 1980. 海中公園センター調査報告 69: 23-52.
- 田島迪生 1970. p. 13-20. 石川増殖研創立記念研究報告. 石川増殖研.

石川～青森（西）：

- 舟橋説往 1967. 能登臨海実験所報 7: 15-36.
 金森 武 1965. 藻類 13: 55-65, 同 1971. 同 19: 28-33.
 加藤君雄ら 1963. 藻類 11: 62-70.
 今野 郁 1971. 藻類 19: 44-50, 同 1973a. 同 21: 1-11, 同 1973b. 同 21: 139-143, 同 1973c. 同 21: 144-149.
 Noda, M. 1960. 新潟大理紀要 II 4: 1-6.
 野田光蔵 1963. 藻類 11: 109-113, 同 1970. 同 18: 147-153, 同 1973. 同 21: 150-159.
 野田光蔵ら 1971. 藻類 19: 21-27.
 大島勝太郎 1952. 富山湾海藻誌. 大東出版.
 斎藤 讓 1956. 北大水産研報 7: 96-108, 同 1959. 藻類 7: 58-62.

大阪湾東岸：

- 大阪湾海岸生物研究会 1981. 大阪市立自然史博物館研報 35: 55-72.
 造力武彦 1973. 大阪成蹊女短大紀要 10: 5-33.

英虞湾：

- 前川行幸ら 1982. 三重大水産実験所報 3: 55-71.
 谷口森俊 1960. 日生態誌 10: 106-108.
 伊勢・三河湾：
- 愛知水試 1956. p. 92-96. 昭31報. 愛知水試.
 稲垣貫一 1951. 自然と人文 2: 76-88.
 石部 修ら 1957. 三重大研究年報, 自然科学 2(2): 78-86.
 片田 実 1975. (引用文献参照).
 濑木紀男ら 1957. p. 21-22. 南知多の自然 (中日自然科学調査報). 中日新聞社, 同 1958. p. 13-14. 北知多の自然 (同). 同.
 高嶺昇ら 1950. 植雑 63: 265-269.
 谷口森俊 1963. 医学と生物 66: 210-212.
 寺井正輝 1965. 藻類 13: 97-101.

東京湾口：

- 新崎盛敏 1975. p. 215-224. 環境と生物指標 2. 共立出版.
 東 穎三 1983. 三浦半島の海藻 (原色). 教育放送出版局.
 高間 浩 1979. p. 105-116. 相模湾資源環境調査報告書, 環境. 神奈川水試.

瀬戸内海：

- Hirose, H. 1975. 岡山大生物紀要 3: 87-100.
 広瀬弘幸ら 1965. 兵庫生物 5(1): 8-11.
 南西水研 1979. 瀬戸内海藻場分布調査報 (分布). 南西水研.
 八木要一 1964. 愛媛県博物館研究報 4: 1-52.

(環 境)

水 温：

- 新崎盛敏 1958a. 水産増殖 5(4): 60-64, 同 1958b. 同 6(2): 27-34.

- 進土福太郎 1964. 沿岸海洋研究ノート 2: 62.
 友定 彰 1982. 東海水研資料集10. 東海水研.

水 質：

- 愛知水試 1982. 研究業績 C23. 愛知水試.
 南西水研 1978. 浅海定線調査 (特殊項目), 昭47-51. 南西水研.
 宇野木早苗ら 1978. p. 439-1444. 伊勢湾における汚染物質の循環機構に関する調査報告書, 産業公害防止協会.

—その他, 関係県浅海定線観測資料—

波：

- 水産庁漁港部 1979. 漁港設計沖波諸元の現状. 水産庁漁港部.
 —その他, 関係県漁港担当部課の漁港設計沖波波高資料—

引 用 文 献

- 新崎盛敏 1958. 海藻類の生育と水温 (II). 水産増殖 6(2): 27-33.
 新崎盛敏 1975. 生物指標としての海藻. p. 215-224. 環境と生物指標 2, 水界編. 日本生態学会環境問題専門委員会編. 共立出版, 東京.
 新崎盛敏 1976. p. 1-147. 海洋科学基礎講座 5, 海藻・ベントス. 東海大出版会, 東京.
 新崎盛敏 1984. 日本周辺の海藻植生 (大型褐藻を中心として). 日本水産資源保護協会, 東京.
 新崎盛敏 1985. アラメ・カジメの分類. 海洋科学 17: 760-768.
 千原光雄・吉崎 誠 1970. 対馬沿岸の海藻相と海藻群落. 国立科博專報 3: 143-158.
 遠藤拓郎・松平康雄 1960. 有用海藻類の地理的分布と水温との関係について. 日水誌 26: 871-876.
 Hirose, H. 1978. Composition of benthic marine algae in relation to pollution in the Seto Inland Sea, Japan. p. 173-179. In A. Jensen and J. R. Stein [ed.] Proc. Intern. Seaweed Symp. 9. Science Press, Princeton.
 片田 実 1975. 潮間帯生物の変動とその指標性に関する研究. p. 362-364. 農林水産生態系における汚染物質の循環と指標生物に関する研究. 農林水産技術会議, 東京.
 川井浩史・丸井 満・黒木宗尚 1982. 半球形石膏による海水流動度合の比較. 藻類 30: 161-162.
 川崎保夫・石川雄介・丸山康樹 1990. アマモ場造成の適地選定法. 沿岸海洋研究ノート 27: 136-144.
 川嶋昭三 1957. 北海道周辺のコンブ類. p. 1-9. 北海道周辺のコンブ類と最近の増・養殖学的研究. 日本藻類学会, 東京.
 喜田和四郎 1966. 伊勢湾及び近傍産ヒトエグサ属の形態並びに生態に関する研究. 三重大水産紀要 7: 81-164.
 木下虎一郎 1942. テングサの北限を制約する要因. 海洋の科学 2(6): 32-39.
 Miki, S. 1933. On the sea-grasses in Japan (I). Bot.

- Mag. (Tokyo) 47: 842-862.
- Miki, S. 1934. On the sea-grasses in Japan (II). Bot. Mag. (Tokyo) 48: 131-142.
- 中原紘之・増田守夫 1971. 緑藻と褐藻の生活史と水平分布. 海洋科学 3: 768-770.
- 岡村金太郎 1931. 海産植物の地理的分布. p. 1-86. 岩波講座, 生物学. 岩波書店, 東京.
- 太田雅隆・二宮早由子 1990. ホンダワラ属海藻の分布と海水流動の関係. 藻類 38: 179-185.
- 太田達夫 1973. 津軽半島における海藻の分布と海流について. 藻類 21: 12-17.
- 斎藤 謙 1972. 日本海沿岸の海藻と生育環境. 新潟県生物教育研究会誌 8: 1-8.
- 瀬川宗吉 1956. 原色日本海藻図鑑. 保育社, 大阪.
- Setchel, W. A. 1920. Temperature interval in the geographical distribution of marine algae. Science 52(1339): 187-190.
- 田中 刚・野沢治治・野沢ユリ子 1962. 南西諸島に産する Sea-Grass について. 鹿児島大南方産業科研報 3: 105-111.
- 谷口森俊 1971. 海洋植物の分布. 海洋科学 3: 778-784.
- Yoshida, T. 1983. Japanese species of *Sargassum* subgenus *Bactrophyicus* (Phaeophyta, Fucales). J. Fac. Sci., Hokkaido Univ. V, 13: 99-246.
- 吉田忠生・中島 泰・中田由和 1990. 日本産海藻目録 (1990年改訂版). 藻類 38: 269-320.

学会出版物

下記の出版物をご希望の方に頒布致しますので、学会事務局までお申し込み下さい。(価格は送料を含む)

1. 「藻類」バックナンバー 価格、会員各号 1,750円、非会員各号 3,000円、30巻4号(創立30周年記念増大号、1—30巻索引付)のみ会員 5,000円、非会員 7,000円、欠号: 1—2号、4巻1、3号、5巻1—2号、6—9巻号。
2. 「藻類」索引 1—10巻、価格、会員 1,500円、非会員 2,000円、11—20巻、会員 2,000円、非会員 3,000円、創立30周年記念「藻類」索引、1—30巻、会員 3,000円、非会員 4,000円。
3. 山田幸男先生追悼号 藻類25巻増補。1977. A 5版、xxviii + 418頁。山田先生の遺影・経歴・業績一覧・追悼文及び内外の藻類学者より寄稿された論文50編(英文26、和文24)を掲載、価格 7,000円。
4. 日米科学セミナー記録 Contributions to the systematics of the benthic marine algae of the North Pacific. I. A. Abbott・黒木宗尚共編。1972. B 5版、xiv + 280頁、6図版。昭和46年8月に札幌で開催された北太平洋産海藻に関する日米科学セミナーの記録で、20編の研究報告(英文)を掲載。価格 4,000円。
5. 北海道周辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究。1977. B 5版、65頁。昭和49年9月に札幌で行なわれた日本藻類学会主催「コンブに関する講演会」の記録。4論文と討論の要旨。価格 1,000円。


Publications of the Society

Inquiries concerning copies of the following publications should be sent to the Japanese Society of Phycology, Shimotachiuri Ogawa Higashi, Kamikyo, Kyoto, 602 Japan.

1. Back numbers of the Japanese Journal of Phycology (Vols. 1—28, Bulletin of Japanese Society of Phycology). Price, 2,000 Yen per issue for member, or 3,500 Yen per issue for nonmember; price of Vol. 30, No. 4 (30th Anniversary Issue), with cumulative index (Vols. 1—30), 6,000 Yen for member, or 7,500 Yen for nonmember (incl. postage, surface mail). Lack: Vol. 1, Nos. 1—2; Vol. 4, Nos. 1, 3; Vol. 5, Nos. 1—2; Vol. 6—Vol. 9, Nos. 1—3.
2. Index of the Bulletin of Japanese Society of Phycology. Vol. 1 (1953)—Vol. 10 (1962), Price 2,000 Yen for member, or 2,500 Yen for nonmember; Vol. 11 (1963)—Vol. 20 (1972), Price 3,000 Yen for member, or 4,000 Yen for nonmember. Vol. 1 (1953)—Vol. 30 (1982), Price 4,000 Yen for member, or 5,000 Yen for nonmember (incl. postage, surface mail).
3. A Memorial Issue Honouring the late Professor Yukio Yamada (Supplement to Volume 25, the Bulletin of Japanese Society of Phycology). 1977. xxviii + 418 pages. This issue includes 50 articles (26 in English, 24 in Japanese with English summary) on phycology, with photographs and list of publications of the late Professor Yukio YAMADA. 8,500 Yen (incl. postage, surface mail).
4. Contribution to the Systematics of the Benthic Marine Algae of the North Pacific. Edited by I. A. ABBOTT and M. KUROGI, 1972. xiv + 280 pages, 6 plates. Twenty papers followed by discussions are included, which were presented in the U.S.-Japan Seminar on the North Pacific Benthic Marine Algae, held in Sapporo, Japan, August 13—16, 1971. 5,000 Yen (incl. postage, surface mail).
5. Recent Studies on the Cultivation of *Laminaria* in Hokkaido (in Japanese). 1977. 65 pages. Four papers followed by discussion are included, which were presented in a symposium on *Laminaria*, sponsored by the Society, held in Sapporo, September 1977. 1,200 Yen (incl. postage, surface mail).

1992年9月15日印刷
1992年9月20日発行

©1992 Japanese Society of Phycology



Printed by Nakanishi Printing Co., Ltd.

編集兼発行者

石川依久子

〒184 小金井市貫井北町4-1-1
東京学芸大学生物学教室内
Tel. 0423-25-2111 内線 2665

印 刷 所

中西印刷株式会社

〒602 京都市上京区下立売通小川東入
Tel. 075-441-3155

発 行 所

日本藻類学会

〒602 京都市上京区下立売通小川東入
Tel. 075-441-3155
振替口座: 京都 1-50488

本誌の出版費の一部は文部省科学研究費補助金「研究成果公開促進費」による。

Publication of The Japanese Journal of Phycology has been supported in part by a Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Result from the Ministry of Education, Science and Culture, Japan.

藻類

目 次

本村泰三：褐藻ワタモ受精過程での雌性配偶子由来セントリオールの消失	(英文) 207
清沢桂太郎：車軸藻節間細胞に対するpH緩衝液の毒性	(英文) 215
Adam T. Wilczok・渡辺 信・川原早苗・鈴木和夫・菅原 淳：重金属耐性緑藻 <i>Chlorella vulgaris</i> と <i>Uronema confervicolum</i> による細胞内カドミウムの不活性化	(英文) 229
C. A. Orosco・大野正夫：日本南岸土佐湾産オゴノリ属海藻の成長速度	(英文) 239
熊野 茂・西海将雄・奥泉 剛・佐藤裕司：大阪湾北西沿岸・福田川河口（神戸市垂水）に於ける珪藻遺骸群集の遷移、特に完新世堆積環境の変遷について	(英文) 245
内田卓志・有馬郷司：オキナワモズク胞子体から作出したプロトプラストの再生	(英文) 261
野崎久義・大谷修司：南極産の <i>Gonium sociale</i> (緑藻・オオヒゲマワリ目)	(英文) 267
能登谷正浩・菊池則雄・有賀祐勝・三浦昭雄：紅藻ウタツツノリの培養	273

◆◆

ノート

Donald Kaczmarczyk・Robert G. Sheath：異なる光条件で生育した淡水産紅藻の色 素含量とC/N比	(英文) 279
梶村光男：ジュズフサノリ（紅藻植物門、ガラガラ科）の選定基準標本の選定	(英文) 283
加藤季夫：プロピオンカーミン染色によるピレノイド・センターの2つの型の識別	287

◆◆

総 説

須藤俊造：海藻・海草相とその環境条件との関連をより詰めて求める試み	289
-----------------------------------------	-----

◆◆

雑 錄

有賀祐勝：髪菜 <i>Nostoc flagelliforme</i> (藍藻) の生育地と分布	307
片山舒康：小・中学校理科教科書における藻類の扱われ方(1)これまでの教科書に みられる変遷	311
川嶋昭二：海藻標本で描いた絵	317
新刊紹介	319
学会録事	321
学術会議だより	322